

	Prefeitura Municipal de Antônio Carlos – SC Secretaria de Saúde e Assistência Social	Unidade Básica de Saúde de Antônio Carlos
POP ENF N° 45 4 Páginas	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP	Data Emissão: 13.09.2023
Elaborado Por: Enfª Ester Azevedo Razzolini de Almeida COREN/SC 567.980	Validado e revisado por: Enfª Suzana Prim Petry COREN/SC 306.853	
Executantes: Enfermeiros e Médicos	Local: Unidade Básica de Saúde/ Equipe Estratégia de Saúde da Família	
CAUTERIZAÇÃO DE VERRUGA ANOGENITAL		

DEFINIÇÃO

Cauterização de verrugas anogenitais causada pelo vírus do HPV.

OBJETIVO

Cauterizar verrugas causadas pelo vírus do HPV, a fim de diminuir a transmissão sexual/vertical.

RESPONSABILIDADE

- O procedimento será realizado em ambiente privativo, por profissional Enfermeiro ou Médico.
- De acordo com Parecer Técnico COREN/SC nº 006/CT/2013, o profissional Enfermeiro é respaldado para realizar o procedimento de cauterização de verrugas anogenitais, desde que habilitado tecnicamente, inexistindo impedimento legal para que o Enfermeiro realize tal procedimento.

MATERIAIS UTILIZADOS:
Profissional Responsável por preparar os materiais para o procedimento: Médico, Enfermeiro ou Técnico em Enfermagem.
Materiais Necessários: <ul style="list-style-type: none">➤ ATA (ácido tricloroacético 80% - 90%) (pode ser usado em gestantes);➤ Haste com ponta de algodão (palito de dente, “cotonete” ou microbrush);➤ Lidocaína tópica ou vaselina;➤ Luva de procedimentos;➤ Mesa ou superfície rígida para disposição dos materiais;➤ Lixeira;➤ Sabão neutro, bicarbonato ou talco (pulverizado no local);

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO:
Profissional Responsável por realizar o procedimento: Enfermeiros ou Médicos.
<ul style="list-style-type: none">➤ Lavar as mãos.➤ Colocar paciente/usuário em posição que favoreça a cauterização, mantendo sua privacidade.➤ Proteger a área ao redor da lesão com lidocaína tópica ou vaselina.➤ Vista as luvas de procedimento.➤ Com cuidado, retirar o ATA do frasco com conta gotas ou Microbrush.➤ Pingar ATA no algodão da ponta do palito ou cotonete de acordo com tamanho da lesão.➤ Aplicar sobre a verruga mantendo um ângulo de 90 graus em relação à pele, fazendo leve pressão até que a verruga fique com uma coloração branco/acinzentada.➤ Esperar secar completamente, o que é indicado pelo branqueamento local (aspecto branco neve).➤ Organizar materiais e ambiente.

OBSERVAÇÕES:

- Na ocorrência de dor na aplicação pode-se neutralizar a ação do ácido com o uso de sabão, bicarbonato de sódio ou talco pulverizado sobre a local.
- Agendar retorno semanal, quinzenal ou conforme necessidade.
- Em geral, 3 aplicações resolvem, mas o tratamento pode ser estendido por até 10 semanas, havendo necessidade, importante ressaltar a taxa de reincidência para tratamento com ATA alcança até 36% nos primeiros 3 meses. Após desaparecimento dos condilomas, não é necessário controle.
- Solicitar sorologias.
- Orientar uso de preservativo em todas relações sexuais.
- Os pacientes devem ser orientados sobre a possibilidade de recorrência, que frequentemente ocorrem nos três primeiros meses.
- Tranquilize o paciente que a maioria das verrugas resolvem espontaneamente em 2 anos.
- Coletar exame citopatológico de colo de útero nas mulheres, conforme critérios de rastreamento de câncer de colo de útero. A rotina de realização do citopatológico não deve ser alterada em função da presença de verrugas por HPV.
- Encaminhar para atenção secundária se:
 - Verrugas com mais de 1cm de diâmetro;
 - Múltiplas lesões complicadas (inflamação importante e/ou infecção no local);
 - Lesões vaginais internas (mucosa) ou colo uterino;
 - Sem melhora após tratamento inicial.
 - Nas gestantes, avaliar se o tempo esperado para tratamento encerra antes da data mínima esperada para o parto. Caso contrário, discutir com médico da equipe e encaminhar para atenção secundária, se necessário. Contudo, cabe destacar que a ocorrência por HPV no canal de parto não contraindica o parto por via baixa (vaginal), já que a infecção do feto ocorre normalmente no período intraútero. Apenas as lesões obstrutivas gerariam contraindicação ao parto vaginal.

REFERÊNCIAS:

BMJ Best Practice. Verrugas genitais.

<http://brasil.bestpractice.bmj.com/bestpractice/monograph/228/treatment/details.htm> Acesso em: 12/05/2022.

Florianópolis-SC. Protocolo de Enfermagem Volume 2, IST Dengue e Tuberculose, SMS Florianópolis. Atualizado em 2020.

PARECER COREN-SC. Parecer 006-2013. Florianópolis, SC, 01 set. 2013. Disponível em:

<http://www.corensc.gov.br/wp-content/uploads/2015/07/Parecer-006-2013-CT.pdf>. Acesso em: 12 maio 2022.